

第2類医薬品

たん・たんのからむせきに

去痰CB錠

なかなか切れない粘稠な“たん”は安眠や安静が妨げられイライラするものです。また、のどにからまるたんやたんを伴うせきは、病中の体力を消耗させ、余病を併発することもあり、早めに処置したいものです。去痰CB錠は2つの去たん成分L-カルボシステインとブロムヘキシン塩酸塩を配合したお薬で、たん・たんのからむせきに効果を発揮します。


ご使用上の注意
してはいけないこと


[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は服用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 高熱のある人
- (6) 心臓病、肝臓病の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、腹痛
精 神 神 経 系	頭痛
そ の 他	血たん

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

下痢、口のかわき

4. 3～4日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

たん、たんのからむせき

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2錠	1日3回
8才以上15才未満	1錠	
8才未満	服用しないこと	

本剤の服用により、一時的にたんの量が増えることがあります。ご心配ありません。


<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法、用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し

裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等
思わぬ事故につながります。)



【成分・分量】

6錠中

成 分	分 量	作 用
L-カルボシステイン	750mg	気道粘膜を正常化し、たんの流動性を高め、出しやすくします。
ブロムヘキシン塩酸塩	12mg	気道粘液の分泌を亢進させ、のどにからんだたんをうすめ、出しやすくします。

添加物としてセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、
お問い合わせのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社浅田 お客様相談室

電話 03-3953-4044 (ダイヤルイン)

時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)