

この箱は本剤とともに保管し、
使用の際にはよくお読みください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起ります。】

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 出血性血液疾患(血友病、
血小板減少症、紫斑病など)
の人

(2) わずかな出血でも重大な
結果をきたすことが予想
される人(血液凝固抑制
作用を有し出血を助長
するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲、粘膜(口腔、
鼻腔、喉など)

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、
薬剤師又は登録販売者に
ご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている
人
(2) 薬などによりアレルギー
症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があら
われた場合は副作用の
可能性がありますので、
直ちに使用を中止し、この
箱を持って医師、薬剤師
又は登録販売者にご相談
ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ、 はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状
がよくならない場合は使用
を中止し、この箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売
者にご相談ください。

ヘパリン類似物質0.3%配合

ヘパドロイド 油性クリーム


乾燥肌を保湿・改善し
肌本来のうるおいへ

保 湿 抗炎症 血行促進

●ヘパリン類似物質0.3%配合
高い水分保持力でしっかり保湿し、
荒れた皮ふ症状を鎮め、皮ふの再生
を促進します。

●油性クリーム(w/o型)
皮ふ表面をしっかりとカバーし、水を
はじいて患部を保護します。べたつか
ず、しっとり肌になじみます。

●赤ちゃんや敏感肌にも
無香料・無着色、ステロイドフリー、
エタノールフリーの保湿クリームです。



* 出血のある傷口には使用しないでください
(血が止まりにくくなることがあります)。

* 顔面にある傷あと・やけどのあと・かさぶたには
使用しないでください。

発売元 **A株式会社浅田館**

東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044

時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168

第2類医薬品

【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・
くるぶしの角化症、手足のひび・
あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性
皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、
きず・やけどのあととの皮ふの
しづり・つっぱり(顔面を除く)、
打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・
関節痛

【用法・用量】

1日1~数回、適量を患部に
擦り込むか、またはガーゼ等に
のばして貼ってください。

●定められた用法、用量を厳守
してください。

●小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに
使用させてください。

●目に入らないように注意して
ください。万一目に入った場合
には、すぐに水又はぬるま湯
で洗ってください。なお、症状
が重い場合には医師の診療
を受けてください。

●外用にのみ使用してください。

【成分・量】

100g中
ヘパリン類似物質.....0.3g
添加物:グリセリン、スクワラン、
流动パラフィン、セラシン、セレ
シン、サラシミツロウ、グリセリ
ン、脂肪酸エチカル、ポリオキシエチ
レンオレイルエーテル、硫酸Mg、
パラベン

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼し
い所に密栓して保管してく
ださい。

(2) 小児の手の届かない所に保
管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないで
ください(誤用の原因になっ
たり品質が変化します)。

(4) 使用期限を過ぎた製品は、
使用しないでください。

乾燥性皮膚用薬