

第3類医薬品

口腔内殺菌消毒薬  
ノンガスタイプ

浅田飴 のどクールスプレー

△ご使用上の注意

してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(2) 授乳中の人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 口内にひだいただいたれのある人

(5) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

【用法・用量】

1日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

●定められた用法、用量を厳守してください。

●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

●のどの塗布用にのみ使用してください。

●ノズルをのどの患部に向けて、アーッと声を出しながら噴射してください(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります)。

●目に入らないように注意してください。万一日に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

【成分・量】100mL中

ポビドンヨード 0.45g

添加物としてヨウ化K、DL-リンゴ酸、グリセリン、L-メントール、エタノール、香料含有

●本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になります)。品質が変化します)。

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(5) 薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。

発売元

A株式会社 浅田飴

東京都東村山市米沢町15-29-7

●お問合せ先、お客様相談室  
電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)  
時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 ジャパンノンティック株式会社

富山県富山市横越168

30mL

第3類医薬品



①

キャップをはずしてください。  
※最初は液が出るまで空押しが行ってください。



②

ノズルは回転できます。



③

ノズルの先端を患部に向けて、噴射塗布してください。  
※吸入しないようにアーッと声を出しながら噴射してください。



④

使用後はきちんとキャップをはめて保管してください。



副作用救済制度 0120-149-931