



この説明文書は、本剤とともに
保管し、服用の際には、よくお読みください。

指定医薬部外品 **浅田飴糖衣P** 口腔咽喉薬

【使用上の注意】 

相談すること 

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、
歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合 [皮ふ]発疹・発赤、かゆみ
(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】のどの炎症による声がれ・のどの痛み・のどの不快感・
のどのはれ・のどのあれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

【成分・分量】セチルピリジニウム塩化物水和物……………6mg
12錠中 グリチルリチン酸二カリウム…………… 15mg
キキョウ流エキス……………1200mg

添加物として還元水アメ、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、
アセスルファムK、塩化Na、DL-リンゴ酸、アラビアゴム、
カルナウバロウ、白糖、ポリソルベート80、トメントール、
タルク、サラシミツロウ、赤色102号、香料含有

0620M1

【用法・用量】

1錠ずつ2錠までを口中に含み、
かまずにゆっくり溶かして服用してくだ
さい。2時間以上の服用間隔をおいてください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)及び 5才以上の小児	2錠	1日3～6回
5才未満	服用しないこと	

※1度に2錠を口中に含まず、1錠ずつなめてください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用さ
せてください。
- かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしま
りしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品
質が変化します)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期
限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

製造販売元 株式会社浅田飴
東京都東村山市久米川町5-29-7
お問合せ先 お客様相談室 03-3953-4044
時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

良薬にして口に甘し
浅田飴