

第2類医薬品

乗物酔い薬

この箱はお薬とともに保管し、
服用の際には、よくお読みください。

⚠️ご使用上の注意

❌**してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。]

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)。

⚠️**相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)排尿困難のある人 (6)緑内障、心臓病の診断を受けた人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
[皮膚] 発疹・発赤、かゆみ [精神神経系] 頭痛 [泌尿器] 排尿困難 [その他] 顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
[再生不良性貧血] 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。[無顆粒球症] 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・
頭痛の予防及び緩和

成分・分量(2錠中)

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
1.333mg
スコポラミン臭化水素酸塩水和物
0.166mg

添加物として還元水アメ、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、白糖、アセシルファムK、塩化Na、DL-リンゴ酸、D-ソルビトール、香料含有

用法・用量

乗物酔いの予防には乗車船30分前に、下記の1回量をかみくだか、又は口中で溶かして服用してください。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
11才以上	2錠 ○○	1日2回を 限度とする
5~10才	1錠 ○	
5才未満	服用しないこと ✕	

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は袋の口を折り返して保管してください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

株式会社 浅田館
東京都東村山市久米川町 5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)
時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)