

&lt;乗物酔い薬&gt;

第2類医薬品 いちご味

## トラベロップQQゼリー子供用

乗物酔いが心配なお子さまに効果を発揮する「いちご味」のお薬です。  
3才から服用できるゼリータイプで、楽しい遠足など外出先でも服用しやすいスティック包装の「乗物酔い薬」です。

## △ご使用上の注意

## ☒してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。】

- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



## 相談すること

- 次の人服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- 医師の治療を受けている人
- 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 高齢者
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 排尿困難のある人
- 緑内障、心臓病の診断を受けた人

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

## 【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

## 【用法・用量】

下記の1回量を、1日2回を限度として服用してください。乗物酔いの予防には、乗車船30分前に服用してください。

なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
3~14才	1包	1日2回を限度とする
3才未満	服用しないこと	

● 定められた用法、用量を厳守してください。

● 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【服用方法】

- 切れ目に沿って完全に切り取ってください。
- 切り口をくわえ、指でしばりだすように服用してください。  
※開封時には、中身の飛び出しにご注意ください。




## 【成分・分量】2包中

成分	分量	作用
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.333mg	自律神経に働き、乗物酔いによるめまいや吐き気を抑えます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.166mg	平衡感覚を調整し、乗物酔いによるめまいや吐き気を抑えます。

添加物として還元麦芽糖水アメ、キシリトール、カラボビーンガム、カンテン、クエン酸、クエン酸Na、アセスルファムK、安息香酸Na、パラベン、香料、エチルバニリン、プロピレングリコール、エタノール含有

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## お問い合わせ

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、  
お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社浅田館 お客様相談室

電話 03-3953-4044

時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 株式会社浅田館  
東京都東村山市久米川町5-29-7

製造販売元 株式会社パナケイア製薬  
富山県高岡市中田4576番地